

EXERCICE 1

Soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par : $g(x) = 4x^3 - 3x - 8$

1)a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

b) Dresser le tableau de variation de g sur $[1; +\infty[$

c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $[1; +\infty[$ une unique solution α et que $\alpha \in [1,4; 1,5]$

d) Déterminer le signe de g sur $[1; +\infty[$

2) Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^3 + 1}{4x^2 - 1}$

a) trouver le domaine de définition de la fonction f et Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) Montrer que $f(\alpha) = \frac{3}{8}\alpha$

c) Montrer que pour tout $x \in [1; +\infty[$ $f'(x) = \frac{xg(x)}{(4x^2 - 1)^2}$

d) Etudier les variations de la fonction f sur $[1; +\infty[$.

e) Montrer que f réalise une bijection de $[\alpha; +\infty[$ sur un intervalle I que l'on précisera.

EXERCICE 2

$$f(x) = \begin{cases} (1+3a)x^2 - 3x & \text{si } x \in]-\infty, \frac{1}{2}] \\ \frac{x^3 - 8}{2x^2 - 5x + 2} & \text{si } x \in]\frac{1}{2}, 2[\\ \sqrt{4x^2 - 1} - ax - 1 & \text{si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$

1°) Déterminer le domaine de définition de f .

2°) Etudier les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

3°) Déterminer a pour que f soit continue en 2 .

EXERCICE 3

Soit h la fonction définie sur \mathbb{R} par $h(x) = -x^3 + 6x^2 + 1$. Le tableau de variations de h est le suivant :

x	$-\infty$	0	4	10	$+\infty$
$h'(x)$	-	\emptyset	+	\emptyset	-
h					

a) Recopier et compléter le tableau de variations.

b) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ n'admet pas de solution sur l'intervalle $] -\infty; 4]$.

c) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution sur l'intervalle $]4; 10]$.

d) A l'aide de la calculatrice, donner un encadrement d'amplitude 10^{-2} de cette solution.

EXERCICE 4

[1] Calculer sans utiliser la calculatrice en détaillant les étapes de calcul.

$$A = \sqrt[4]{5} \times \sqrt[3]{125} ; B = 5^{\frac{2}{3}} \times \sqrt[6]{25} ; C = \sqrt[5]{81} \times 3^{\frac{1}{5}}$$

[2] 1°) Développer $(2 + \sqrt{2})^3$ et $(2 - \sqrt{2})^3$.

2°) En déduire la valeur exacte de $A = \sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} - \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$.

[3] Soit a un réel strictement positif. Simplifier $A = \frac{\sqrt[3]{a^5} \times (\sqrt[4]{a^7})^2}{(a^2)^2 \times \sqrt[3]{a^2} \times \sqrt[3]{a^3}}$.

[4] Calculer $A = \frac{27^{-\frac{2}{3}} \times 49^{\frac{1}{2}} \times 16^{\frac{5}{4}}}{(\sqrt[5]{243})^2}$.

[5] Résoudre dans \mathbb{R} l'équation $\sqrt[3]{5-2x} = 2$.

On commencera par préciser le domaine de résolution de l'équation.