

EXERCICE N°1

Soit f la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{4x^2 + x} + 2x + 1$

1°) Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur $[0, +\infty[$

2°) Montrer que f est une bijection de $[0, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

3°) Sur quel ensemble f^{-1} est-elle continue ?

4°) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$

5°) Montrer que l'équation $f(x) = x + 2$ admet une solution unique $a \in \left] \frac{1}{4}, \frac{1}{2} \right[$

EXERCICE N°2

On considère la fonction f définie par : $f(x) = (x + 1)\sqrt{x + 1} - 1$

1°) Etudier la dérivabilité de f à droite en -1 .

2°) Etudier les variations de f .

3°) Montrer que f est une bijection de $[-1, +\infty[$ sur un intervalle I que l'on déterminera.

4°) Expliciter la fonction réciproque g de f .

EXERCICE N°3

Soit $f : x \mapsto f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$.

1°) Déterminer le domaine de définition D_f de f .

2°) Etudier la dérivabilité de f sur D_f .

3°) Montrer que f est une bijection de $[0, 1[$ sur un intervalle J que l'on précisera

4°) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$

EXERCICE N°4

Soit $f : x \mapsto f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

1°) Etudier la dérivabilité de f sur \mathbb{R} .

2°) Montrer que f est une bijection de \mathbb{R} sur un intervalle J que l'on précisera

3°) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$

EXERCICE N°5

On considère la fonction f définie sur $]-1, 1[- \{0\}$ par : $f(x) = 1 + \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

On note par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé R .

1°) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ et interpréter les résultats obtenus

2°) Etudier la dérivabilité de f en point d'abscisse $x=1$ et interpréter le résultat obtenu.

3°) Etudier la dérivabilité de f en point d'abscisse $x=-1$ et interpréter le résultat obtenu.

4°) Montrer que : $\forall x \in]-1, 1[- \{0\} : f'(x) = \frac{-1}{x^2 \sqrt{1-x^2}}$

5°) Dresser le tableau de variation de la fonction f .

6°) Montrer que f réalise une bijection de $]0, 1[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

7°) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .

8°) Représenter dans le même repère R la courbe C et C' de f^{-1} .

EXERCICE N°7

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ a & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad \text{où } a \in \mathbb{R}$$

1°) Déterminer le domaine de définition de f .

2°) Pour quelle valeur de a , f est continue en 0 .

3°) Préciser suivant a , l'ensemble de continuité de f

4°) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x \cdot f(x) + 1 - x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot f(x)$

EXERCICE N°8

$$\text{Soit } f(x) = \begin{cases} \frac{x+1}{2x-3} & \text{si } x \leq 1 \\ \frac{2m-x}{2-x} & \text{si } 1 < x \leq \frac{3}{2} \\ \frac{x^2+1}{x^2+2x-4} & \text{si } x > \frac{3}{2} \end{cases}$$

1°) Trouver m pour que f soit continue en 1 .

2°) Pour la valeur du réel m trouvée. Etudier la continuité de f en $x_0 = \pi/3$.

EXERCICE N°9

$$f(x) = \begin{cases} (1+3a)x^2 - 3x & \text{si } x \in \left[-\infty, \frac{1}{2}\right[\\ \frac{x^3 - 8}{2x^2 - 5x + 2} & \text{si } x \in \left[\frac{1}{2}, 2\right] \\ \sqrt{4x^2 - 1} - ax - 1 & \text{si } x \in [2, +\infty[\end{cases}$$

1°) Déterminer le domaine de définition de f .

2°) Etudier les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

3°) Peut-on déterminer a pour que f soit continue en 2 .

4°) Préciser suivant a , l'ensemble de continuité de f .

EXERCICE N°10

Répondre par Vrai ou Faux.

1°) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$ et si, pour tout réel x , $f(x) > g(x)$, alors $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = +\infty$

2°) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ et si $g(x) < 0$ pour tout x , alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = -\infty$.

3°) Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, alors soit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$, soit $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

EXERCICE N°11

1°) Démontrer que l'équation : $x^3 + x - 3 = 0$ admet une unique solution $a \in]1; 2[$

2°) Donner une valeur approchée par défaut de cette a à 10^{-1} près.

EXERCICE N°12

Montrer que l'équation $x^3 - 5x^2 + 4x + 7 = 0$ admet au moins une racine réelle. Plus généralement, montrer que toute équation polynomiale de degré impair admet au moins une racine réelle. Qu'en est-il si le degré est pair ?